

Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

44M - 5 juin 1991

GRANDES CULTURES SEMENCES


LUZERNE A GRAINES - N° 5

(en collaboration avec la FNAMS et les SUAD de l'Aude, du Gard et de l'Hérault)

CECIDOMYIES :

- Zones précoces : renouvellement du traitement
- Zones tardives et parcelles précoupées précoces : premier traitement

PUCERONS : Très fortes populations localement



Evolution du bourgeonnement et position des deux traitements préventifs contre la Cécidomyies

TRAITEZ à l'aide du fenvalerate à 30 g/ha (SUMICIDIN 10 à 0,3 l/ha). Ce traitement sera également efficace sur pucerons.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67 92 41 42



MAÏS (Gard - Hérault)

- **SESAMIE** : début du vol - protection des cultures de semences
- **VERS GRIS** : infestations localement importantes

SESAMIE : le premier vol vient de débiter (fin mai), mais de façon timide jusqu'à ce jour.

Préconisation :

- zones à risque potentiel élevé, en tenant compte des aires d'extension du ravageur en 1990.
 - > 2 traitements sont préférables à 2 semaines d'intervalle
- autres zones (et maïs consommation)
 - > 1 seul traitement sur observation des tous premiers dégâts.

Utilisez l'un des produits suivants : DIMILIN (0,5 kg/ha) ou un pyréthrinoloïde (voir dépliant de protection du maïs du bulletin n°2 du 19 avril) qui sera également efficace sur vers gris.

Traitez en soirée avec un fort volume d'eau.

... EN BREF EN BREF ...

PUCERONS DES EPIS sur CEREALES :

- additif au bulletin du 23 mai 1991 : de nombreuses spécialités à base de pyréthrinoloïdes (alphaméthrine, fenvalérate, esfenvalérate, bifenthrine, cyfluthrine, deltaméthrine, ...) sont également efficaces.

PHOMOPSIS sur TOURNESOL (Aude) : pas de projections d'ascospores observées à ce jour.